


Viri TE Dip

Använd biocider på ett säkert sätt.

Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.



PRODUKTTYP	Juverdesinficering
ANVÄNDNING	Viri TE Dip är en färdig att använda lösning för användning som juverhygien i djurhållning. Viri TE Dip kan användas som ett dopp omedelbart efter mjölkning
EGENSKAPER	Viri TE Dip består av en unik formula med bl.a. mjölksyra, glycerin och eterisk olja. Viri TE Dip har god vidhäftningsförmåga och lämnar en tunn täckande film på huden som skyddar och förhindrar skadliga bakterier i omgivningen från att tränga in i juvret. Spenhuden tillförs vård, varigenom uttorkning, sår och sprickbildning förebyggs. Produktet virker baktericid och är effektiv mot ästsvampar.
FÖRVARING:	Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Förvaras frostfritt. Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaring: 0 - 30 °C Hållbarhet: 24 månader.
GODKÄNNANDE	Desinficeringsprodukt för spenar på djur som kan mjölkas (kor, bufflar, får, getter) för användning efter mjölkning. Godkännandenummer: 537907-8 Innehavare av produktgodkännande: Novadan ApS Platinvej 21 6000 Kolding Denmark Användarkategorier: Yrkesmässig användare Typ av formulering: AL - Övriga vätskor.
SÄKERHET	Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering och transport av produkten. Skyddsglasögon måste användas vid hantering av produkten. Efter hudkontakt: skölj med vatten. Avlägsna kontaminerade kläder och skor. Sök medicinsk rådgivning om hudreaktion eller obehag uppstår. Efter ögonkontakt: skölj omedelbart med vatten (i minst 15 minuter). Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp om obehag kvarstår. Ha produktbehållaren eller etiketten till hands om det krävs medicinsk rådgivning.
MILJÖEFFEKTER	Se till att förhindra att spill rinner ner i avlopp, kloaker eller kommer ut i vattendrag. Informera relevant myndighet om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft). Gräv diken för att samla upp större vätskespill. Stoppa upp och/eller absorbera spill med ett inert material och placera det därefter i en passande behållare som försluts och avyttras i enlighet med föreskrifter. Placera inte utspillda material i den ursprungliga behållaren.

SV Senast
uppdaterad:

09.07.2019

DK: Platinvej 21, DK-6000 Kolding
Tlf: +45 76 348 400

1/2

NOVADAN®

AVFALLSHANTERING

Avyttra oanvänd produkt och förpackning i enlighet med lokala föreskrifter.
En använd produkt kan spolas ned i det kommunala avloppet eller avyttras i gödselbehållaren, beroende på de lokala föreskrifterna.
Undvik utsläpp till ett enskilt reningsverk.
Tomma behållare ska sköljas med mycket vatten och avyttras som normalt eller kommersiellt avfall.
Pappershanddukar som använts för att rengöra spenar slängs i de vanliga sopbehållarna.
Återanvänd inte behållarna i något syfte.

FÖRPACKNING

Plastdunk	5 L, 10 L, 20 L, 60 L
Plastfat	200 L
IBC	1000 L

PRODUKTDATA

Färg	Röd. / Orange.
Fysisk form	Vätska.
Lukt	Karaktäristisk.
Bulkthet	~ 1,05 kg/l.
pH Koncentrat	~ 3,0

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Klart att användas.

Påförs rena och torra spenar omedelbart efter mjölkning.

Kan användas 1 – 3 gånger per dag.

Per behandling:

Kor och bufflar: 4 ml/djur

Får: 2 ml/djur

Getter: 2 ml/djur

Produkten måste ha en temperatur på över 20 °C innan de används.

Användning av en doseringspump för att fylla produkten i appliceringsutrustningen är att rekommendera.

Var noga med att produkten inte avlägsnas efter applicering för att säkerställa tillräcklig kontakttid. Låt produkten vara kvar på spenarna och se till att djuren står i minst fem minuter efter desinficering efter mjölkning.

Manuell doppning (RTU)

Fyll behållaren med RTU-produkten och skruva fast doppkoppen överst. Rengör noggrant spenarna genom att torka av dem med en engångspappershandduk eller trasa omedelbart före mjölkning.

Efter mjölkning, pressa behållaren och för på doppkoppen på varje spene underifrån för att se till att hela spenen är nedsänkt i desinfektionsmedlet. Fyll på med nytt desinfektionsmedel vid behov genom att pressa behållaren. Efter desinficering ska behållaren tömmas och behållare och doppkopp ska rengöras genom att sköljas med vatten.

Automatisk doppning (RTU)

Öppna en förpackning med RTU-produkten och för in automatiska doppsystemets sugslang.

Före mjölkning ska spenarna rengöras noggrant av en automatisk process eller manuellt.

Efter mjölkning stängs vakuumet av och spendesinfektionsmedlet sprutas in i ett rör på centralenheten. Spenarna har täckts med 2–4 ml doppvätska när spenkoppen dras av med automatiska avtagaren, ACR (Automatic Cluster Removal). När ACR har avlägsnats ska varje insats i det automatiska doppsystemet sköljas noggrant med vatten och blåsas ur med tryckluft. I ett sista rengöringssteg efter varje mjölkningstillfälle av besättningen ska insatserna desinficeras (t.ex. med en klorinbaserad produkt) och blåsas ur igen med tryckluft. Efteråt är mjölkningssystemet redo för nästa mjölkningstillfälle. Hela processen är automatiserad.